


**ured:**  
**Doverska 29, Split**  
**tel: 459 988**  
**fax: 459 989**  
**mob:098 9032487**

**Hrvatska Udruga**  
**Liječenih i Oboljelih od Hepatitisa**  
**"HEPATOS"**



**ABCDE?**

**otkrij!**

**info Hep centar**  
**Fra Bonina 11**  
**021 322 - 888**

**savjetovanište za oboljele**  
**radno vrijeme: ponedjeljkom**  
**zimi: 17:00 - 19:00**  
**ljeti: 18:00- 20:00**

**psihološko savjetovanište**  
**srijedom**  
**16:00 – 17:30**

**spriječi!**

**izliječi!**

**HEPATITIS**

## HEPATITIS JE OZBILJNA VIRUSNA BOLEST JETRE

smatra se da će do 2010.  
hepatitis C pobiti više ljudi nego AIDS

**VAŽNO GA JE SPRIJEČITI I RANO OTKRITI**

samo ranim otkrivanjem kao i pravovremenim  
učinkovitim liječenjem možemo spriječiti  
širenje i razvoj bolesti sa svim njezinim  
komplikacijama

**IMA VIŠE VRSTA, A NAJOPASNIJE SU B I C**

## HEPATITIS C SE NE PRENOSI:

- kihanjem
- grljenjem
- kašljanjem
- dojenjem
- hranom ili vodom
- zajedničkim korištenjem pribora za jelo i čaša
- slučajnim dodirom
- rukovanjem

# NE

## KAKO SE MOŽEŠ ZARAZITI?

- seksualnim odnosom u 90% slučajeva
- uporabom zaražene igle, što zapravo znači i putem krvi i telesnih tekućina (sperma, vaginalni sekret) zaraženu osobu

- uporabom zaražene igle u 90% slučajeva
- uporabom iste šprice
- slučajni ubod
- tetovaža
- body piercing
- bušenje ušiju
- transfuzijom krvi prije 1992. godine
- seksualnim odnosom 2-7%
- s majke na dijete

## KOJI SU SIMPTOMI?

- bez simptoma – možeš dugo biti zaražen, a da i ne znaš
- u blagoj formi (ako se i pojave) simptomi su:
  - umor
  - tupi bol ispod desnog rebarnog luka
  - gubitak apetita
  - bol u mišićima i tetivama
  - proljev
  - povraćanje
  - žutica (r rijetko)

cijepljenjem  
izbjegavanjem seksualnih odnosa  
(posebice bez zaštite)

## KAKO GA MOŽEŠ IZBJEĆI?

**CJEPIVO PROTIV HEPATITISA C NI POSTOJI**

- izbjegavanjem uporabe nesterilnih igala
- izbjegavaj - tetoviranja
  - body piercing
  - bušenje ušiju
- nesterilnim iglama kod sumnjivih i ilegalnih davatelja takvih usluga koje samo žele zaraditi
- izbjegavanjem seksualnih odnosa (posebice bez zaštite)

## TKO SE TREBA TESTIRATI?

- osobe koje uzimaju ili su uzimale opojne droge putem injekcije
- djeca majki zaraženih HIV-om
- osobe rizičnog seksualnog ponašanja
- osobe na dijalizi
- hemofiličari
- osobe koje su primale transfuziju ili su liječene krvnim derivatima prije 1992. godine
- ako želiš znati

## KOJE SU POSLJEDICE?

- kronični hepatitis
- ciroza jetre
- rak jetre
- zatajenje jetre - transplantacija
- smrt